

Lignes directrices de pratique clinique de l'American College of Prosthodontists

Restaurations dentaires à appui dentaire



1 Entretien professionnel : (Prothèses amovibles et fixes)



Effectuer un examen de la santé extrabuccale et intrabuccale ainsi que des dents, en vérifiant les dents existantes, les éléments prothétiques et la prothèse elle-même. Identifier et corriger les problèmes cliniques qui pourraient entraîner de futures complications.



Effectuer les interventions d'hygiène buccodentaire (nettoyage de toutes les dents naturelles et des restaurations à appui dentaire) en utilisant des méthodes mécaniques et chimiques reconnues par les professionnels.



Utiliser des agents oraux topiques et des outils d'hygiène buccodentaire, selon les besoins cliniques.



Fabriquer un appareil occlusal pour protéger les restaurations fixes à appui dentaire, au besoin.

2 Éducation des patients et entretien :



Les patients avec des dents naturelles existantes et des dents ayant subi des restaurations multiples et complexes doivent recevoir pour instructions de se brosser les dents deux fois par jour avec des agents oraux topiques, tels qu'un dentifrice contenant 5 000 ppm de fluorure et/ou un dentifrice avec 0,3 % de triclosan.

- En supplément, ajouter l'utilisation à court terme du gluconate de chlorhexidine, au besoin.



Recommander des outils d'hygiène buccodentaire, tels que la soie dentaire, les hydropulseurs, les appareils à jet air, les produits de nettoyage interdentaire et les brosses à dents électriques qui répondent aux besoins du patient.



Les patients ayant un appareil occlusal doivent le porter durant le sommeil, puis le nettoyer avant et après l'utilisation à l'aide d'une brosse douce et de l'agent de nettoyage prescrit.



Les patients ayant une prothèse amovible doivent recevoir pour instructions d'enlever la prothèse avant de se coucher, puis de la ranger dans la solution de nettoyage prescrite.

3 Rappel des patients :



Un rappel pour un examen dentaire professionnel tous les six mois est de mise dans le cadre d'un régime à vie.

- Les patients identifiés comme étant très à risque sont conseillés de se soumettre à un examen dentaire professionnel à un intervalle de moins de six mois.

Bidra AS, Daubert DM, Garcia LT, et al. ACP Clinical Practice Guidelines : Recall and Maintenance of Patients with Tooth-Borne and Implant-Borne Dental Restorations. *J Prosthodont* 2016; 25 : S2-S40.

L'American College of Prosthodontists tient à remercier Colgate Oral Pharmaceuticals, filiale de Colgate-Palmolive Company, pour la subvention pédagogique sans restriction octroyée afin d'élaborer ces lignes directrices.



VOTRE PARTENAIRE EN SANTÉ BUCCODENTAIRE

Lignes directrices de pratique clinique de l'American College of Prosthodontists

Restaurations dentaires sur implants



1 Entretien professionnel :

(Biologique et mécanique)



Effectuer un examen de la santé extrabuccale intrabuccale et des dents, en vérifiant les dents existantes, les éléments prothétiques et la prothèse elle-même. Identifier et corriger les problèmes cliniques qui pourraient entraîner de futures complications.



Effectuer les interventions d'hygiène buccodentaire (nettoyage des dents naturelles, des restaurations à appui dentaire et sur implants, ou des piliers implantaires) en utilisant des instruments de nettoyage reconnus par les professionnels et des systèmes électriques d'aéro-polissage avec poudre de glycine compatibles avec les implants et les matériaux de restauration.



Utiliser le gluconate de chlorhexidine comme agent oral topique de prédilection lorsqu'une action antimicrobienne est requise selon les besoins cliniques.



Ré-évaluer le contour de la prothèse pour faciliter l'entretien à domicile.



La prothèse et les éléments prothétiques qui compromettent la fonction doivent être ajustés, réparés, remplacés ou reconstruits, au besoin.



Envisager d'utiliser de nouvelles vis prothétiques lorsqu'une restauration sur implants est enlevée et remplacée aux fins d'entretien.



Fabriquer un appareil occlusal pour protéger les restaurations fixes sur implants, au besoin.

2

Éducation des patients et entretien à domicile :



Les patients ayant subi des restaurations multiples et complexes doivent recevoir pour instructions d'utiliser des agents oraux topiques, tels qu'un dentifrice contenant 0,3 % de triclosan.

- En supplément, ajouter l'utilisation à court terme du gluconate de chlorhexidine, au besoin.



Recommander des outils d'hygiène buccodentaire, tels que la soie dentaire, les hydropulseurs, les appareils à jet air, les produits de nettoyage interdentaire et les brosses à dents électriques qui répondent aux besoins du patient.



Les patients ayant un appareil occlusal doivent le porter durant le sommeil, puis le nettoyer avant et après l'utilisation à l'aide d'une brosse douce et de l'agent de nettoyage prescrit.



Les patients ayant subi des restaurations partielles ou complètes sur implants doivent recevoir pour instructions d'enlever la prothèse avant de se coucher, puis de la ranger dans la solution de nettoyage prescrite.

3

Rappel des patients :



Un rappel pour un examen dentaire professionnel tous les six mois est de mise dans le cadre d'un régime à vie.

- Les patients identifiés comme étant très à risque sont conseillés de se soumettre à un examen dentaire professionnel à un intervalle de moins de six mois.

Bidra AS, Daubert DM, Garcia LT, et al. ACP Clinical Practice Guidelines : Recall and Maintenance of Patients with Tooth-Borne and Implant-Borne Dental Restorations. *J Prosthodont* 2016; 25 : S2-S40.

L'American College of Prosthodontists tient à remercier Colgate Oral Pharmaceuticals, filiale de Colgate-Palmolive Company, pour la subvention pédagogique sans restriction octroyée afin d'élaborer ces lignes directrices.



VOTRE PARTENAIRE EN SANTÉ BUCCODENTAIRE